














77. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Prunus persica* Stokes (pesco)

DESCRITTORI MORFOLOGICI

I descrittori raccomandati secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV/CPVO e IBPGR, sono segnalati con un asterisco (*).

| n. | Codici: UPOV/CPVO IBPGR | DESCRITTORE | CULTIVAR DI RIFERIMENTO | LIVELLO DI ESPRESSIONE |
|-----------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 GIBA | 1 - | Dimensione dell'albero | | |
| | | molto piccolo | Bonanza | 1 |
| | | piccolo | Compact Redhaven | 3 |
| | | medio | Spring Lady | 5 |
| | | grande | Redhaven | 7 |
| | | molto grande | Babygold 5 | 9 |
| 2 GIBA | 3 6.1.1 | Portamento dell'albero | | |
| | | colonnare | Pillar, Alice-up | 1 |
| | | assurgente/eretto | Rich Lady | 2 |
| | | semiretto/globoso | Redhaven | 3 |
| | | espanso | Albertina | 4 |
| | | pendulo/ricadente | | 5 |
| | | piangente | Biancependulo | 6 |
| 3 | - 6.1.3 (*) | Fabbisogno in freddo | | |
| | | molto scarso (< 450h) | Flordastar | 1 |
| | | scarso (450-650 h) | Springtime | 2 |
| | | medio (650-850 h) | Springerest | 3 |
| | | alto (850-1.050 h) | Redhaven | 4 |
| | | molto alto (> 1.050 h) | Mayflower | 5 |
| 4 GIBA | 65 (*) 4.2.1 | Epoca di inizio fioritura | | |
| | | molto precoce | Flordastar | 1 |
| | | precoce | Royal Glory | 3 |
| | | intermedia | Elegant Lady | 5 |
| | | tardiva | Maria Laura | 7 |
| | | molto tardiva | Fairlane | 9 |
| 5 GIBA | 10 (*) 4.2.3 | Tipo di fiore | | |
| | |  campanulaceo | Redhaven | 1 |
| | |  rosaceo | Rome Star, Royal Glory | 2 |
| 6 | - 6.2.2 | Fiore: polline | | |
| | | assente | Flaminia | 1 |
| | | presente | Redhaven | 9 |

| | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|-------------|---|
| 7 GIBA | 31 (*) 6.1.5 | Forma glandole fogliari | | | |
| | |  | assenti | Tejon | 0 |
| | |  | globose | Springcrest | 1 |
| | |  | reniformi | Redhaven | 2 |
| 8 GIBA | 67 (*) 4.2.2 | Epoca di inizio maturazione | | | |
| | | molto precoce | Flordastar | 1 | |
| | | precoce | Springcrest | 3 | |
| | | intermedia | Rome Star | 5 | |
| | | tardiva | Red Star | 7 | |
| molto tardiva | Percoco di Tursi | 9 | | | |
| 9 GIBA | 45 (*) 4.2.4 | Pubescenza del frutto | | | |
| | | assente | Big Top | 1 | |
| | | presente | Redhaven | 9 | |
| 10 GIBA | 33 (*) 6.2.4 | Dimensione del frutto | | | |
| | | molto piccolo | Maybelle | 1 | |
| | | piccolo | Françoise | 3 | |
| | | medio | Redhaven | 5 | |
| | | grande | Orion | 7 | |
| molto grande | Babygold 5 | 9 | | | |
| 11 GIBA | 34 (*) 6.2.5 | Forma del frutto in proiezione longitudinale | | | |
| | |  | Stark Saturn, UFO | 1 | |
| | | piatta (platicarpa) | | | |
| | |  | Crimson Lady | 2 | |
| | | oblata | | | |
| | |  | Springbelle | 3 | |
| rotonda | | | | | |
|  | O'Henry | 4 | | | |
| ellittica | | | | | |
|  | Flavortop | 5 | | | |
| ovata | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|---------------|---------------|---|
| 12 GIBA | 40 6.2.7 | Colore di fondo del frutto | | | |
| | | verde chiaro | Carman | 1 | |
| | | bianco crema | Michelini | 2 | |
| | | giallo chiaro | Fuzalode | 3 | |
| | | giallo | Redhaven | 4 | |
| | | arancione chiaro | Red Top | 5 | |
| | | arancione | Kakamas | 6 | |
| 13 GIBA | 42 6.2.8 | Sovraccolore della buccia | | | |
| | | Assente | Ghiaccio | 0 | |
| | | rosa | Yumyeong | 1 | |
| | | rosso chiaro | Glohaven | 2 | |
| | | rosso | Crimson Lady | 3 | |
| | | rosso intenso | Rich Lady | 4 | |
| 14 GIBA | 43 - | Tipo di sovraccolore del frutto | | | |
| | |  | uniforme | Rome Star | 1 |
| | |  | striato | Babygold 7 | 2 |
| | |  | marezzato | Regina Bianca | 3 |
| 15 GIBA | 44 - | Estensione del sovraccolore del frutto | | | |
| | | assente | Ghiaccio | 1 | |
| | | < 25% | Romea | 2 | |
| | | 26-50 % | Maria Marta | 3 | |
| | | 51-75 % | Redhaven | 4 | |
| | | > 75 % | Rich Lady | 5 | |
| 16 GIBA | 50 (*) 4.2.5 | Colore della polpa | | | |
| | | bianco-verdastro | Grezzano | 1 | |
| | | bianco | Rosa del West | 2 | |
| | | bianco-crema | Ghiaccio | 3 | |
| | | giallo chiaro | Sunhaven | 4 | |
| | | giallo | Orion | 5 | |
| | | giallo intenso | Red Moon | 6 | |
| | | aranciato chiaro | Keimoes | 7 | |
| | | rosso | Sanguigna | 9 | |
| 17 GIBA | 6.2.11 - | Tipologia della polpa | | | |
| | | fondente | Rome Star | 1 | |
| | | non fondente | Romea | 2 | |
| | | "stony hard" | Ghiaccio | 3 | |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|-----------------------|---|
| 18 GIBA | 49 6.2.10 | Consistenza della polpa | | |
| | | molto soffice | S. Anna Balducci | 1 |
| | | soffice | Maria Rosa | 3 |
| | | media | Redhaven | 5 |
| | | soda | Rome Star | 7 |
| | | molto soda | Ghiaccio | 9 |
| 19 GIBA | 63 (*) 6.3.3 | Aderenza della polpa al nocciolo | | |
| | | spicca | Rome Star | 1 |
| | | semiaderente | Springcrest | 2 |
| | | aderente | Romea | 3 |
| 20 GIBA | 55 - | Dolcezza della polpa | | |
| | | molto bassa (< 8° Brix) | Flordastar | 1 |
| | | bassa (8,1-10,0° Brix) | Springbelle | 2 |
| | | media (10,1-12,0° Brix) | Rome Star | 3 |
| | | alta (12,1-14,0° Brix) | Big Top | 4 |
| | | molto alta > 14° Brix | Ghiaccio, Maria Dolce | 5 |
| 21 GIBA | 56 - | Acidità della polpa (meq/100ml) | | |
| | | molto bassa (< 5) | Royal Glory | 1 |
| | | bassa (5-8) | Big Top | 2 |
| | | media (8,1-10) | Rich Lady | 3 |
| | | alta (10,1-13) | Armking | 4 |
| | | molto alta > 13 | Amбра | 5 |
| 22 GIBA | 57 6.3.1 | Dimensioni del nocciolo | | |
| | | piccolo (< 5 g) | Springtime | 1 |
| | | medio (5-12 g) | Redhaven | 2 |
| | | grande (> 12 g) | Dixiland | 3 |
| 23 | - 8.2.8 | Grado di suscettibilità alla bolla (<i>Taphrina deformans</i>) | | |
| | | resistente | | 0 |
| | | molto scarsa | | 1 |
| | | scarsa | | 3 |
| | | media | | 5 |
| | | alta | | 7 |
| | | molto alta | | 9 |
| 24 | - 8.2.2 | Grado di suscettibilità all'oidio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>) | | |
| | | resistente | | 0 |
| | | molto scarsa | | 1 |
| | | scarsa | | 3 |
| | | media | | 5 |
| | | alta | | 7 |
| | | molto alta | | 9 |
| 25 | - 8.1.4 | Grado di suscettibilità all'afide verde (<i>Myzus persicae</i>) | | |
| | | resistente | | 0 |
| | | molto scarsa | | 1 |
| | | scarsa | | 3 |
| | | media | | 5 |
| | | alta | | 7 |
| | | molto alta | | 9 |

| | | | |
|----|------------|---|-----------------------|
| 26 | - 8.1.3 | Grado di suscettibilità alla cidia (<i>Cydia molesta</i>) | |
| | | resistente | 0 |
| | | molto scarsa | 1 |
| | | scarsa | 3 |
| | | media | 5 |
| | | alta | 7 |
| 27 | - 8.2.1 | Grado di suscettibilità alla monilia (<i>Monilinia laxa</i>) | |
| | | resistente | 0 |
| | | molto scarsa | 1 |
| | | scarsa | 3 |
| | | media | 5 |
| | | alta | 7 |
| 28 | | Grado di suscettibilità alla sharka (<i>Plum Pox Virus</i>) | |
| | | resistente | Maria Dolce 0 |
| | | molto scarsa | Nectaross, Tastared 1 |
| | | scarsa | Venus 3 |
| | | media | ... 5 |
| | | alta | ... 7 |
| | | molto alta | Rome Star, Big Bang 9 |